


# 痔



恥ずかしい、怖い(痛み、出血、肛門からの脱出物)  
悩んでいませんか?(日本人の3人に1人は痔主)



## <手術の必要性は?>

◆痔核(いぼ痔):外からは見えない内痔核と外にでている外痔核があります。

若い人で今までナントモナカッタ人が、急に肛門のフチにカタマリが出来て痛くてしまう人がいます。**血栓性外痔核**です。2~3日で痛みはとれます。

それを繰り返す人又**出産後外痔核**がある人は必ず内痔核があるものです。

指で押し込んでも又セキやクシャミ、労働で**出てきてしまふ**ものは、手術をお勧めします。

◆裂肛(切れ痔):一時的な症状だったらバナナウンチをして医家用の座薬で治療するでしょう。それ程の頻度でなければOKです。**何ヶ月も何年も症状を繰り返したり、続いたりした時は手術をお勧めします。**

(若い女性に多い)



◆痔ろう : **手術以外の根治療法はありません。**

何回も膿が出てイヤだと思ったら手術をすべきです。痔ろうはホットクとガンになるからと言われる若者がいますが、ウソです。50歳過ぎになって急にシコリが大きくなったり、初めて膿瘍になった場合はガンも否定できませんので、なるべく早く手術をすることをお勧めします。

手術の時は軽い仕事でも  
10日間は休務期間をもらつて予定をつけてください。



## <お尻にいたわりを・痔にならない>

### 悪化させない心がけ

- 1、下痢も痔を悪化させる原因
- 2、お尻を冷やさない、うつ血させない
- 3、繊維質を豊富にとって便秘解消
- 4、長いトイレは痔のもと、1分で切り上げる
- 5、大酒は痔を悪化させる、適量にとどめる
- 6、下剤の連用には思わぬ落とし穴が
- 7、ゴルフは痔を治してから



### トピックス 食物の体内通過時間は?

食物→食道→胃→小腸→大腸→大便まで1~2日

大腸に送られた食物のかすはここで水分を吸収

9~16 時間

(肛門のところで**カス**が一定量溜まるのを待つ)

↓  
大便 (排出)

炭水化物は 3 時間

脂肪は 6 時間位かかる  
胃を通過します。

